



**Dipartimento di Diagnostica per Immagini**

Direttore: Dr. F. Musante

## CLISMA A DOPPIO CONTRASTO DEL COLON

**Dieta:** nei due giorni precedenti l'esame abolire l'assunzione di frutta e verdura.

### **IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME:**

**ORE 8 :** Effettuare la colazione con caffè, latte o thè, due fette di pane biscottato. Assumere 1 flacone di X-Prep o 13 compresse di Pursennid (l'indicazione del nome del farmaco è puramente indicativa; resta a discrezione del Medico curante la possibilità di prescrivere prodotti analoghi di comprovata pari efficacia).

**ORE 12:** pranzo con esclusione di frutta e verdura.

**ORE 15:** assumere una bustina da 30 gr. di Solfato di Magnesio disciolta in un bicchiere d'acqua. Nelle ore successive all'assunzione del Solfato di magnesio è necessario bere circa litri 1,5 di **acqua non gasata** entro le ore 21,00.

**ORE 20:** cena con una tazza di brodo vegetale.

**ATTENZIONE:** La preparazione descritta non ammette deroghe né in difetto (riduzione delle dosi), né in eccesso (aumento delle dosi). Sono inutili e controindicati i clisteri di pulizia.

**Per i pazienti diabetici:** si tenga conto della presenza di glucosio nei preparati per la pulizia intestinale (da acquistare in farmacia) specifici per esami radiologici, mentre non esistono controindicazioni per le compresse di Pursennid .

**RACCOMANDAZIONE** :tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata in visione al momento dell'effettuazione dell'esame diagnostico.

**AVVERTENZA:** non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.