

## PREPARAZIONE N° 6

- ❖ Paziente a digiuno da almeno 8 ore
- ❖ 1 ora prima dell'esame il Paziente deve assumere una soluzione di 1 litro di acqua con Moviprep (2 bustine A + 2 bustine B) o similare.
- ❖ 10 minuti prima dell'esame il Paziente deve assumere una soluzione di 1/2 litro di acqua con Moviprep (1 bustina A + 1 bustina B) o similare.
- ❖ il Paziente deve portare con sé 2 bottiglie da 1,5 l
- ❖ Dosaggio della creatininemia sierica (eseguito nei 3 mesi precedenti; nella settimana precedente in caso di patologia acuta o di evento esterno che possa aver influenzato negativamente la funzionalità renale)

**RACCOMANDAZIONE:** tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata in visione al momento dell'effettuazione dell'esame diagnostico.

Nel caso in cui il valore di e-GFR fosse <30, si prega di contattare il Servizio di Radiologia presso cui sarà eseguito l'esame non appena ottenuta la data dell'appuntamento, onde poter mettere in atto adeguati provvedimenti.

**AVVERTENZA:** la terapia medica eventualmente in atto non deve essere sospesa.

Fanno eccezione i Pazienti che assumono metformina e devono eseguire entero-TC, che devono contattare il Servizio di Radiologia non appena ottenuta la prenotazione.