

## SCATENAMENTO CON AGOCANULA E PERMANENZA IN OSPEDALE PER MONITORARE LA REAZIONE ALLERGICA

### 1. INSERIMENTO AGOCANULA



Il medico o l'infermiere inserisce un'agocanula in un braccio per poter somministrare piccole quantità di alimento o farmaco.

### 2. SCATENAMENTO CONTROLLATO



Vengono somministrate piccole dosi in modo graduale e controllato, aumentando passo dopo passo. Tu sei sempre sotto controllo.

### 3. PERMANENZA IN OSPEDALE E MONITORAGGIO



Rimani in ospedale per alcune ore. Il personale controlla il tuo stato di salute e i tuoi parametri (cuore, pressione, ossigeno).

No reazione ✓



Se va tutto bene, potrai tornare a casa.

Reazione lieve



Se compaiono sintomi lievi, vieni curato e continuiamo a monitorarti.

Reazione importante



Se hai una reazione importante, ti curiamo subito e resti in ospedale finché sei in sicurezza.



Siamo qui per prenderti cura di te. È normale sentirsi un po' in ansia, ma tutto il team è con te per fare questo esame in modo sicuro.



il dottore mi chiama entro in stanza e mi sdraio sul lettino

mi viene inserito un ago nel braccio in questo momento posso sentire dolore

dovrò rimanere in ospedale per un po' di tempo mi chiameranno ogni tanto per inserire

del liquido nell'ago se sto bene posso andare a casa mi toglieranno l'ago e potrei

sentire dolore se mi sento male rimango in ospedale e il dottore mi curerà