

S.C. Radiologia

All. 008 BIS-03/IROC 46

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER ESAMI

RM PELVI **(solo per studio retto)**

Si consiglia

Il giorno dell'esame:

- ❖ 4 ore prima dell'esame toeletta rettale con clistere
- ❖ Ipotonia intestinale farmaco-indotta (N-butilbromuro di joscina 20 mg ev, salvo controindicazioni) immediatamente prima di posizionare il paziente sul lettino RM (1,2,3).

RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata in visione al momento della effettuazione dell'esame diagnostico.

AVVERTENZA: non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.

1. *Linee guida Rete Oncologica Piemonte 2018 "Requisiti minimi di qualità per l'esecuzione e la refertazione dell'esame di stadiazione del tumore del retto con Risonanza Magnetica"*
2. *"Magnetic resonance imaging for diagnosis and neoadjuvant treatment evaluation in locally advanced rectal cancer: a pictorial review"- G.Engin, R. Sharifov – World J. Of Clinical. Oncol. -2017;vol.8:214 229*
3. *"Preoperative staging of rectal cancer: a review of imaging techniques" – C.Hunter and G.Brown- Expert Review of Gastroenterology and Hepatology 2016, Vol.10, no 9, 1011-1025*